

Rymsor®

Metoprolol Tartrato

Composición y Presentaciones:

Comprimidos recubiertos de liberación prolongada 25mg-50mg-100mg

Indicaciones:

Hipertensión, para disminuir la presión arterial y disminuir el riesgo de morbi-mortalidad cardiovascular y coronaria (lo cual incluye la muerte súbita).

Angina pectoris.

Insuficiencia cardíaca crónica, sintomática y estable con disfunción ventricular izquierda sistólica, en complemento de un tratamiento existente contra la insuficiencia cardíaca.

Prevención de la muerte de origen cardíaco y del reinfarcto tras la fase aguda del infarcto de miocardio.

Arritmias cardíacas, en particular taquicardia supraventricular, reducción de la frecuencia ventricular en la fibrilación auricular y en caso de extrasístoles ventriculares.

Palpitaciones provocadas por trastornos de la función cardíaca.

Profilaxis de la migraña.

Vía administración:

Administración oral.

Período de Eficacia:

24 meses almacenado a no más de 30 °C.

Envase primario:

Caja de cartón o cartulina impresa o etiquetada, debidamente sellada y rotulada, que contiene frasco de PEAD blanco, con tapa de polipropileno y filler de algodón, más folleto de información al paciente en su interior. Todo debidamente sellado y rotulado.

Dr.Reddy's 

La Buena
Salud
No Puede
Esperar



Referencias:

1: Información de Registro Sanitario disponible en <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-24659/19>