

# Pemgem<sup>®1</sup>

## Pemetrexed

### Composición y Presentaciones:

Estuche con 1 frasco ampolla conteniendo 500 mg del activo Pemetrexed.

### Indicaciones:

Este medicamento, en combinación con un agente platino está indicado para:

- 1.- El tratamiento de pacientes con mesotelioma pleural maligno cuya enfermedad no es resecable o que de cualquier modo no son candidatos a cirugía curativa.
- 2.- Como monoterapia para el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzando o metastásico después de quimioterapia previa. En combinación con cisplatino, está indicado para el tratamiento en primera línea de pacientes con cáncer pulmonar a células no pequeñas localmente avanzado o metastático, excepto aquellos que tengan histología predominantemente de células escamosas.
- 3.- Como monoterapia para el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar a células no pequeñas localmente avanzado o metastático, excepto aquellos que tengan histología predominantemente de células escamosas, después de quimioterapia previa.
- 4.- Como monoterapia de mantenimiento de pacientes con cáncer pulmonar a células no pequeñas localmente avanzado o metastático, excepto aquellos que tengan histología predominantemente de células escamosas, cuya enfermedad no ha progresado luego de cuatro ciclos de quimioterapia de primera línea con un agente platino.

### Equivalencia Terapéutica:

Producto Bioequivalente



### Período de Eficacia:

24 meses.

24 horas almacenado entre a 2°C y 8°C

después de la reconstitución/dilución con solución de NaCl 0,9% si es realizada en condiciones asépticas de control

### Envase primario:

Frasco ampolla de vidrio transparente incoloro de tipo I USP con goma de bromo butilo y sello flip-off.



La Buena  
Salud  
No Puede  
Esperar

### Referencias:

1: Información de Registro Sanitario disponible en <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-24233/18> - <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-24234/18>