

Purpulz®

Bendamustina Clorhidrato

Composición y Presentaciones:

PURPULZ SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA PERFUSIÓN 180 mg/4mL

Cada frasco ampolla multidosis de 4 mL contiene:

Bendamustina Clorhidrato : 180 mg. Excipientes: Butilhidroxitolueno, macrogol.

Indicaciones:

●LLC: Tratamiento de primera línea de la leucemia linfocítica crónica (estadio de Binet B o C) en pacientes para los que la quimioterapia de combinación con fludarabina no sea adecuada.

●LNH: Linfomas no Hodgkinianos indolentes como monoterapia en pacientes que hayan empeorado tras el tratamiento durante 6 meses siguientes al tratamiento con rituximab o con un régimen que incluyera rituximab.

●MM: Tratamiento de primera línea del mieloma múltiple (estadio II de Durie-Salmon con empeoramiento o estadio III) en combinación con prednisona para pacientes mayores de 65 años no elegibles para trasplante autólogo de células germinales y que, en el momento del diagnóstico, presenten una neuropatía clínica que impida el empleo de un tratamiento que contenga talidomida o bortezomib.

Vía administración:

LLC: 100 mg/m² de superficie de área corporal de Bendamustina los días 1 y 2; cada 4 semanas.

LNH: 120 mg/m² de superficie corporal de clorhidrato de bendamustina los días 1 y 2; cada 3 semanas. MM: 120 – 150 mg/m² área de superficie corporal clorhidrato de bendamustina los días 1 y 2, 60 mg/m² área de superficie corporal de prednisona i.v. o por vía oral en los días 1 a 4; cada 4 semanas.

Período de Eficacia:

24 meses. Almacenar y transportar refrigerado (2-8°C). No congele. Protéjase de la luz.

Envase primario:

Frasco ampolla de 5 mL de vidrio ámbar tipo I, con tapón de goma de 20 mm y sello flip off.

La Buena
Salud
No Puede
Esperar



Referencias:

1: Información de Registro Sanitario disponible en <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-26131/21>