

Tazatred®

Dasatinib

Composición y Presentaciones:

Cada comprimido recubierto contiene Dasatinib 50 mg 70 mg y 100 mg

Indicaciones:

Indicado para el tratamiento de pacientes adultos con:

Leucemia mieloide crónica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) en fase crónica de diagnóstico reciente.

LMC Ph+ en fase crónica, acelerada, o mieloblástica o linfoblástica con resistencia o intolerancia a tratamiento previo, incluido imatinib.

Leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) con resistencia o intolerancia a tratamiento previo.

Equivalencia Terapéutica:

Producto Bioequivalente



Vía administración:

La dosis de inicio recomendada para la fase crónica de LMC es 100 mg de Dasatinib una vez al día.

Período de Eficacia:

24 meses. Dasatinib es estable hasta la fecha indicada en el empaque cuando es almacenada en su envase original.

Condiciones de almacenamiento:

Almacene a una temperatura inferior a 30°C

Envase primario:

Botella de HDPE y/o blíster alu-alu.

La Buena
Salud
No Puede
Esperar



Referencias:

1: Información de Registro Sanitario disponible en <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-26411/21> - <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-26546/21> - <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-26547/21>